

# Lubera®-Kulturanleitung



## Eine Lubera® Heidelbeere pflanzen

**Pflanzenzeit:** ganzjährig mit Containerpflanzen

**Standort:** gut besonnt; nur in saurem Boden; da diese Bedingungen bei uns natürlich kaum gegeben sind, muss ein Moorbeet angelegt werden.

**Abstand:** Heidelbeeren 80 – 100 cm; als Unterbepflanzung pro Heidelbeere ca. 2 Preiselbeeren oder Moosbeeren möglich.


**Preis- und Moosbepflanzung:** pro m<sup>2</sup> 3 – 5 Pflanzen

**Pflanzung:**

- Wichtig: Ausgiebiges Wässern des Moorbeetes, da Torf das Wasser nur langsam aufnehmen kann
- Topf entfernen und verfilzten Wurzelballen etwas aufreissen
- Pflanze so tief einpflanzen, dass der Topfballen mit 3-5 cm Erde bedeckt ist


**Achtung:** Auch Dickmaulrüssler lieben das nahrungsreiche Moorbeet. Am besten jede Pflanzung präventiv oder nach den ersten Befallsanzeichen jeweils Ende April und Ende September mit Nematoden (mikroskopisch kleine Fadenwürmer, die die Dickmaulrüsslerlarven parasitieren und bekämpfen) angiesen.

## Lubera® Moorbeet



**Mit Torfbällen:**


- ein ganzer Ballen Torfmüll wird in den Boden eingelassen; Seitenwände werden belassen; Löcher sorgen für die notwendige Entwässerung; genug Platz für 2 Kulturheidelbeeren



**Einfaches Moorbeet:**

- Aushub ca. 80 cm tief
- auskleiden der Grube mit Plastikfolie, um das Eindringen des kalkhaltigen Grundwassers zu verhindern
- Löcher zur Entwässerung anbringen

## Lubera® Topfkultur



**Topfkultur:**

- für einen Heidelbeerstrauch sollte ein Pflanzgefäß von ca. 20 l und mehr gewählt werden
- als Pflanzsubstrat eignet sich neben Torf und Moorbeeterde ganz besonders gut auch Tannensägemehl, welches 2x im Jahr mit Osmocote aufgedüngt wird (März/Juni je 20 g Osmocote 8-9 Monate)

## Lubera® Kulturanleitung

**Schnitt/Erziehung:**

- nach drei bis vier Jahren jedes Jahr den jeweils ältesten Ast des Strauches entfernen

**Mulchen:**

- frühestens nach zweitem bis dritten Standjahr eine Mulchschrift ins Moorbeet einbringen. Dies sollte nicht zu dick sein.
- Mulchen direkt nach dem Pflanzen führt zu Wachstumsstörungen

**Düngung:**

- nur sauerwirkende Dünger einsetzen; z.B. Rhodo-Dünger 60 g/m<sup>2</sup>; bewährt hat sich auch der Langzeitdünger Osmocote 8 – 9 Mte: total 40 g/m<sup>2</sup> in zwei Gaben (Frühjahr sowie während Fruchtreife)

**Biologische Pflanzenschutzmassnahmen:**

- 3 Wochen vor Erntebeginn (vor Farbumschlag) Vogelschutznetz anbringen

Stauen Sie mit, wie unkonventionell Moosbeeren geerntet werden ...

